

TALON XT BLOQUES 0,005%

DESCRIPCIÓN

TALON® XT Bloques es un poderoso rodenticida anticoagulante de segunda generación, de dosis única, que controla eficazmente ratones o lauchas, ratas del tejado y guarenes, incluso aquellos resistentes a los rodenticidas de uso común.

TALON® XT Bloques mata a los roedores con la primera dosis que ingieren y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre 2 a 5 días después de su ingesta.

TALON® XT Bloques posee una formulación altamente palatable aumentando la atractividad y rápido consumo por los roedores.

TALON® XT Bloques contiene **BITREX®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

RECOMENDACIONES DE USO

TALON® XT Bloques encerados es un cebo listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores en exteriores ya que es altamente resistente a la humedad.

- Aplicar **TALON® XT Bloques** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores ej. fecas, huellas, etc.
- Colocar **TALON® XT Bloques** donde los roedores circulan, viven o se alimentan.
- En caso de una infestación alta, repita la aplicación cada 7 días hasta que cese el consumo.
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimentan como por ej.: Alcantarillas, canales de desagües, vigas, jardines, árboles, madrigueras, instalaciones industriales, agrícolas, pecuarias y domésticas.
- Utilizar portacebos (tubos de PVC), para evitar el consumo del producto por parte de especies no objetivo (perros, gatos, animales silvestres) o niños.

Ratas y guarenes: Colocar 1 a 2 bloques cada 10 metros.

Lauchas y ratones: Colocar 1 bloque cada 5 metros.



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Consultas al Fono (2) 2941 0100 o al mail: soluciones.profesionales@syngenta.com

Código de Barra:

Lote / Vencimiento: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

RATICIDA EN BLOQUES



Talon[®] XT

Bloques 0,005%

PROFESIONAL

TALON BLOQUES 0,005%

PRODUCTO GOLD

COMPOSICIÓN

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....	0,005 g
Bitrex*.....	0,001 g
Derivados de cereales c.s.....	100 g

* Benzoato de denatonium.



LISTO PARA USAR EN EXTERIORES O LUGARES HUMEDOS



Contenido Neto: 4 Kilos

syngenta



Clasificación Toxicológica OMS/EPA: Clase IV
"Poco Probable Peligro en su Uso Normal"
PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado

Grupo químico: Hidroxicumarinas.

Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado). Producto de Banda Verde.

Condición de venta: Especializada (Uso Profesional)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Conservar TALON® XT Bloques en su envase original.**
- **Usar guantes para su manipulación.**
- **No comer, beber ni fumar durante la aplicación.**
- **Enterrar o eliminar los roedores muertos y cebo no consumido.**
- **Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.**
- **Mantener lejos del alcance de aves y animales.**
- **No colocar cebo en áreas que están en contacto con alimentos o sean accesibles para niños o animales domésticos.**
- **No almacenar junto con alimentos o forrajes.**
- **En caso de envenenamiento llamar a un médico.**
- **Riesgo Ambiental: Tóxico para peces, crustáceos y aves. No eliminar a cursos o fuentes de aguas.**
- **Manejo de envases vacíos: Incineración y/o eliminación en instalaciones autorizadas.**
- **Este producto es muy tóxico para mamíferos y vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores muertos.**

PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico CITUC al fono: +56 2 2635 3800, las 24 horas.**
- **SIGNOS DE INTOXICACIÓN: después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta varios días después hemorragias de intensidad variable.**

ANTIDOTO

- **Vitamina K1 (Fitomenadiona) oral o inyectable. Adultos 40 mg /día. Niños: 20 mg /día (ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad).**
- **ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE AVES Y ANIMALES.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- **Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2 2635 3800**
- **Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2 2941 0100**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y MASCOTAS

Fabricado por: HACCO, Inc. 110 Hopkins Drive, Randolph, Wisconsin 53956, Estados Unidos.

Importado y distribuido por: Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes, Santiago.

Bajo Licencia de Syngenta Protecao de Cultivos Ltda. Brasil.

Registro ISP N° P- 786/22

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.