

R A T I C I D A



DEADLINE®



La elección de confianza



Soft Bait

✓ **Máximo atractivo en todo tipo de ambientes**

Deadline Soft Bait es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata ratas y ratones. Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 - 7 días de su ingestión.

Es un cebo blando elaborado con cereales de grado alimenticio y un alto porcentaje de aceite, lo que asegura el consumo por parte de los roedores sin importar su especie.

Puede ser empleado en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, oficinas, establos y todo tipo de construcciones e incluso permite cebar directamente las madrigueras de los roedores.

Modo de uso: Producto listo para usar. Distribuya los cebos en los lugares de tránsito de los roedores, en cajas o tubos cebadores. Reponga cada 1 semana hasta que cese el consumo.

Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser manipulado por adultos. No beber, fumar o comer durante su aplicación.

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de alcantarilla) <i>Rattus rattus</i> (Rata de Tejado)	1 a 2 sachets / 5 a 10 metros lineales.
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 sachet / 2 a 4 metros lineales.

Evite el contacto con la piel, use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de su manipulación. Ubique los puntos de cebo en lugares no accesibles para niños, animales y lejos de alimentos, bebidas y lugares de preparación de éstos. Evite que el producto tome contacto con fuentes de agua. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.

Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos de forma segura. Este producto es tóxico para mamíferos y animales de vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o roedores envenenados. Almacene en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperatura ambiente. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación.

Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones.

Primeros Auxilios

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Antídoto: Vitamina K.


En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800 (atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56)2 2749 8540 (en horario de oficina).

Grupo Químico: Derivado cumarínico.

Condición de venta: General.

Registro ISP N° P-618/22

Composición:
Cada 100g contiene:
Bromadiolona0,005g
CAS N° 28772-56-7
Benzoato de Denatonio.....0,001g
Excipientes c.s.p. 100g



CONTENIDO
5 Kg
Sachets de 10g Aprox.



MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

Fabricado por:
Unichem d.o.o.,
Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika,
Eslovenia.

Importado y Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.,
Mar del Sur 7356, Pudahuel,
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl



Clasificación Toxicológica III.
Ligeramente peligroso.

